

**ЛИГНИКОЛНИ ВИДОВИ ГАБИ, ПЛОДНОТО ТЕЛО Е ВО ФОРМА НА
ПОТКОВИЦА ИЛИ ПЛОДНИТЕ ТЕЛА СЕ ПОДРЕДЕНИ КАКО
КЕРАМИДИ; РЕТКО СО ДРШКА**

1.	Хименофорот е мазен (<i>Stereum</i>)	28
1.*	Хименофорот е со пори или ламели	2
2.	Хименофор со пори	4
2*.	Хименофор со ламели	3
3.	Со нормални ламели	<i>Pleurotus ostreatus</i>
3*.	Со разделени ламели	<i>Schizophyllum commune</i>
4.	Порите се округли или овални	7
4*.	Порите се лабиринтни	5
5.	Порите се типично лабиринтни	6
5*.	Порите не се типично лабиринтни, потсетуваат на ламели	<i>Lenzites betulina</i>
6.	Расте на пенушки од <i>Quercus</i> (даб)	<i>Daedalea quercina</i>
6*.	Најчесто расте на <i>Salix</i> (врба)	<i>Daedaleopsis confragosa</i>
7.	Плодното тело е со дршка, шапката е најчесто покриено со лушпи или мазна	8
7*.	Плодните тела се во форма на потковица или подредени како керамиди, без лушпи	13
8.	Плодните тела се многубројни мали шапки, со заедничка дршка, со темносива боја, хименофор е со бела до крем боја	<i>Grifola frondosa</i>
8*.	Плодните тела се поединечни, или во групи од неколку претставници	9
9.	Шапката е со големи димензии (2-60 cm во пречник), покриена со лушпи или како лакирана	10
9*.	Шапката е со мали димензии (3-10 cm во пречник)	12
10.	Пвршината на шапката е покриена со лушпи	11
10*.	Пвршината на шапката е како лакирана	<i>Ganoderma lucidum</i>
11.	Дршката е скоро централно поставена и тенка (до 1,5 cm), порестиот слој на хименофорот е слабо декурентен (постепено се спушта кон дршката), расте на почва или на паднати гранки од листопадни дрвја	<i>Polyporus tuberaster</i>
11*.	Дршката е често латерална и релативно кратка, дебела (до 5 cm), порестиот слој на хименофорот е силно декурентен (директно се спушта кон дршката), расте на гнили листопадни дрвја	<i>Polyporus squamosus</i>
12.	Дршката во основата е црна	<i>Polyporus varius</i>
12*.	Дршката во основата не е црна	<i>Polyporus arcularius</i>
13.	Плодните тела се во форма на потковица	14
13*.	Плодните тела се подредени како керамиди	23
14.	Со светло сива боја, опасен паразит на бука	<i>Fomes fomentarius</i>
14*.	Со кафеава боја	15
15.	Со црвена линија по работ на плодното тело	<i>Fomitopsis pinicola</i>

15*.	Без црвена линија по работ на плодното тело, со темнокафеава боја	16
16.	Хименофорот е со светла боја, бела до светлокафеава <i>Ganoderma applanatum</i>	
16*.	Хименофорот е со темна боја, циметна до темнокафеава	17
17.	Плодните тела се едногодишни, со мека конзистенција, отворите на порите се лацератни (раскинати) <i>Inonotus hispidus</i>	
17*.	Плодните тела се повеќегодишни, со тврда конзистенција, отворите на порите се правилни	18
18.	Паразит на дива фоја (<i>Juniperus excelsae</i>), трамата е 'рѓаво црвено обоена <i>Pyrofomes demidoffii</i>	
18*.	Паразит на други дрвја, трамата е темнокафеава (<i>Phellinus</i>)	19
19.	Растат на иглолисни дрвја	20
19*.	Видови кои растат на листопадни дрвја	21
20.	На <i>Abies</i> <i>Phellinus hartigii</i>	
20*.	На <i>Pinus</i> <i>Phellinus pini</i>	
21.	На јасика <i>Populus tremulae</i> <i>Phellinus tremulae</i>	
21*.	На други листопадни дрвја	22
22.	На <i>Salix</i> (врба) <i>Phellinus igniarius</i>	
22*.	На <i>Prunus</i> (слива, јаболка) <i>Phellinus pomaceus</i> (<i>Phellinus tuberculosus</i> syn.)	
23.	Плодните тела се со сулфурно жолта боја <i>Laetiporus sulphureus</i>	
23*.	Плодните тела се различно обоени, со концентрични зони на горната површина	24
24.	Порите се неправилни	25
24*.	Порите се правилно округли	26
25.	Хименофорот е сив до сивокафеав, сапроб на листопадни дрвја <i>Cerrena unicolor</i>	
25*.	Хименофорот е со виолетови нијанси, сапроб на иглолисни дрвја <i>Trichaptum abietinum</i>	
26.	Хименофорот е светло до темносив, слојот на цевчињата е одвоен со тенка темна линија <i>Bjerkandera adusta</i>	
26*.	Хименофорот е белузлав, сивкав или кафеав (<i>Trametes</i>)	27
27.	Горната површина со крупни густе влакна, со еднобојни концентрични зони <i>Trametes hirsuta</i>	
27*.	Горната површина е кадифеста, со добро изразени разнобојни концентрични зони <i>Trametes versicolor</i>	
28.	Химениумот при засекување поцрвенува	29
28*.	Химениумот при засекување не поцрвенува, со жолта до окер боја; има јасно видливи влакненца на горната површина на плодното тело <i>Stereum hirsutum</i>	
29.	Сапроби на паднати гранки и пенушки од листопадни дрвја	30
29*.	Сапроби на паднати гранки и пенушки од иглолисни дрвја <i>Stereum sanguinolentum</i>	
30.	Сапроби на <i>Quercus</i> (даб) <i>Stereum gausapatum</i>	
30*.	Сапроби на <i>Alnus</i> , <i>Corylus</i> , <i>Betula</i> , <i>Fagus</i> <i>Stereum rugosum</i>	