

ЛИГНИКОЛНИ ВИДОВИ ГАБИ СО КОРЕСТО ПЛОДНО ТЕЛО

1. Хименофорот е со пори или запци 2
- 1.* Мазен хименофор 3
2. Хименофор со пори *Schizopora paradoxa*
- 2.* Хименофорот со запци *Irpex lacteus*
3. Плодното тело е целосно прикрупено за супстратот (ресупинатни видови) 4
- 3*. Плодното тело е делумно прикрупено за супстратот и формира мали шапки без дршки 5
4. Видови кои се развиваат под кора, со светли бои *Vuilleminia comedens*
- 4*. Не се развиваат под кора, со интензивна сина боја *Terana caerulea* (syn. *Pulcherricium caeruleum*)
5. Плодното тело не е желатинозно во свежа состојба (*Stereum*) 8
- 5*. Плодното тело е желатинозно во свежа состојба 6
6. Плодното тело е во форма на ушна школка, со кафеава до темно црвена боја 7
- 6*. Плодното тело не е во форма на ушна школка, со светла боја, најчесто жолта *Tremella mesenterica*
7. Плодното тело без влакненца на горната површина *Auricularia auricula-judae* (syn. *Hirneola auricula-judae*)
- 7*. Плодното тело со влакненца на горната површина *Auricularia mesenterica*
8. Химениумот при засекување поцрвенува 9
- 8*. Химениумот при засекување не поцрвенува, со жолта до окер боја; има јасно видливи влакненца на горната површина на плодното тело *Stereum hirsutum*
9. Сапроби на паднати гранки и пенушки од листопадни дрвја 10
- 9*. Сапроби на паднати гранки и пенушки од иглолисни дрвја *Stereum sanguinolentum*
10. Сапроби на *Quercus* (даб) *Stereum gausapatum*
- 10*. Сапроби на *Alnus*, *Corylus*, *Betula*, *Fagus* *Stereum rugosum*